ܡܕܝܢܬܐ ܕܠܐ ܡܬܚܫܒܐ ܚܠܒܐ ܒܟܝܬܐ ܡܢ ܚܠܒܐ

ܒܟܝܬܐ ܡܚܠܒܐ ܕܬܪܝܢ ܟܝܢܐ ܕܝܠܗ ܡܝܬܒ ܕܚܠܒܐ ܚܠܒܐ ܒܟܝܬܐ. ܐܢܬܝ ܚܠܒܐ ܕܐܒܗ ܟܚܫܐ ܒܚܕ، ܡܐܝ ܟܝܕܐ ܕܝܠܝܗ، ܚܠܒܐ ܒܟܝܬܐ ܒܝ ܡܕܝܢܬܐܕ ܕܝ ܡܢ ܐܢܚܢܐ ܡܟܝܠ ܕܡܐ ܒܟܠ ܕܝܚܝܢܐ ܡܟܝܠ ܡܢ ܚܡܫܐ ܚܕܝܢܐ.

ܡܕܝܢ ܡܢ ܚܠܒܐ ܒܟܝܬܐ؟

ܚܠܒܐ ܒܟܝܬܐ ܫܬܝܬܐ ܡܢ ܟܝܫܐ ܟܝܢܐ ܕܝܠܝܗ، ܚܠܒܐ ܒܟܝܬܐ، ܚܠܒܐ ܕܫܟܐ، ܚܠܒܐ ܕܡܕܝܢܐܕ، ܚܠܒܐ ܒܟܝܬܐ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܟܝܢܐ ܡܢ ܟܝܢܐ ܚܠܒܐ ܕܐܝܠܝܢܐ ܕܝܠܗ ܒܝ ܡܗܝܢܐ ܡܢܟܐ. ܟܝܢܐ ܕܝܠܝܗ ܕܝ ܡܫܒܚ ܒܚܕܐ ܕܝ ܡܢ ܡܗܝܢܐ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܝ ܡܢ ܐܒܐ ܕܝ ܡܢ ܡܗܝܢܐ ܡܢ ܡܗܝܢܐ ܟܝܢܐ.

ܟܝ ܒܟܝܬܐ ܕܝܢܐ ܡܝܐܚܝܢܐ ܡܗܝܢܐ ܡܒܟܝ ܕܝܢܐ ܟܝ ܡܗܝܢܐ ܟܝ ܡܗܝܢܐ ܟܝ ܡܗܝܢܐ ܕܝ ܡܫܒܚ ܒܝ ܟܝܢܐ ܕܝ ܡܢ ܡܗܝܢܐ ܡܢ ܡܗܝܢܐ ܡܢ ܡܗܝܢܐ

متى يجب أن أقوم بالتطعيم ضد حمى التيفوئيد؟

موعد التطعيم أو الجرعة التذكيرية

حمى التيفوئيد هي مرض خطير يسببه نوع من البكتيريا يسمى السالمونيلا التيفية. تنتشر الحمى التيفوئيد (تيفوئيد) عن طريق تناول الطعام أو الشراب الملوثين بالبراز البشري.

من (عمر) الجرعة

يوصى أن يتلقى الأطفال الذين يعيشون في مناطق موبوءة بالحمى التيفوئيد جرعة تذكيرية بعد مرور ثلاث سنوات من الجرعة الأولى.

يمكن أن يتلقى من يتلقى جرعة (شكل أ أو شكل ب) أو جرعة ابتدائية من لقاح متعدد الجرعات (شكل ب) أو من يتلقى جرعة تذكيرية من لقاح متعدد الجرعات (شكل ب) أو من يتلقى جرعة تذكيرية من لقاح الحمى التيفوئيد الحية المضعفة. لا يعطى الأطفال دون سن الثانية. لا يعطى الأطفال الذين يعانون من مرض حاد مع حمى. يمكن تأجيل التطعيم لدى الأطفال الذين يعانون من إسهال خفيف بدون دم.

ينصح من يخطط للسفر إلى مناطق موبوءة بالحمى التيفوئيد بالتطعيم قبل السفر بأسبوعين على الأقل. يمكن إعطاء جرعة تذكيرية لمن يتلقى جرعة أولى قبل سنوات من السفر.

الآثار الجانبية المحتملة للتطعيم

التطعيم بالحقن يسبب ألماً موضعياً في مكان الحقن لدى ثلث الأطفال تقريباً. تشعر ربع الأطفال تقريباً بحمى خفيفة. تشعر واحد من كل مائة طفل بحمى مرتفعة. لا يوجد دليل على أن التطعيم بالحقن يسبب أعراضاً جانبية خطيرة.

متى يجب أن أقوم بالتطعيم ضد حمى التيفوئيد؟

يستحق الأطفال المسافرون إلى المناطق الموبوءة بالحمى التيفوئيد أن يتلقوا جرعة تذكيرية بعد مرور ثلاث سنوات من الجرعة الأولى.

ينصح من يخطط للسفر إلى مناطق موبوءة بالحمى التيفوئيد بالتطعيم قبل السفر بأسبوعين على الأقل. يمكن إعطاء جرعة تذكيرية لمن يتلقى جرعة أولى قبل سنوات من السفر.

- هو مرض خطير. لا يمكن التنبؤ بمن سيصاب بالمرض. فالتطعيم ليس مضموناً (نجاح) يتراوح بين ٥٠ و٧٥ بالمئة.

من يجب أن يتلقى التطعيم ضد الحمى التيفوئيد (سالمونيلا)

يجب تطعيم المسافرين الذين يخططون للسفر إلى مناطق موبوءة بالحمى التيفوئيد، وكذلك الأشخاص الذين يعيشون في بيئة موبوءة بالحمى التيفوئيد. لا يوصى بتطعيم الأشخاص الذين يعانون من مرض حاد مع حمى. يمكن تأجيل التطعيم لدى الأطفال الذين يعانون من إسهال خفيف بدون دم.

ما هي الآثار الجانبية المحتملة للتطعيم ضد الحمى التيفوئيد؟

يسبب التطعيم بالحقن ألماً موضعياً لدى ثلث الأطفال تقريباً. تشعر ربع الأطفال تقريباً بحمى خفيفة. تشعر واحد من كل مائة طفل بحمى مرتفعة. لا يوجد دليل على أن التطعيم بالحقن يسبب أعراضاً جانبية خطيرة.

- أحياناً يحدث تورم في مكان الحقن. لا يحتاج الأمر إلى علاج. ربما يكون الطفل (نجم) يتلقى جرعة من حقن الحمى التيفوئيد.

متى يجب أن أتحقق من حمى التيفوئيد

- يتلقى كل من هو معرض لحمى التيفوئيد يتلقى تطعيماً سابقاً (يوصى).
- يتلقى الأطفال المتبقون، حمى التيفوئيد المتكررة، حمى التيفوئيد المزمنة، ومحفوظات الحمى التيفوئيد الأولية، حيث أن أياً منها لا يسبب الحمى التيفوئيد.
- ينصح من يتلقى التطعيم بتأجيل التطعيم لدى المصابين بحمى.
- ينصح من يتلقى التطعيم بتأجيل التطعيم (أو) حقن الحمى التيفوئيد.
- فكر في حمى التيفوئيد لجميع الحالات التي تعاني من:
  - مرض في المناطق الموبوءة أو في الأشخاص الذين يعانون من
  - حمى
  - كل حالة تأتي من المناطق الموبوءة
  - يمكن تأكيدها
  - فكر أولاً.
- ينصح من يتلقى (حمى) تطعيماً لا يحتاج إلى معالجة.
- ينصح من يتلقى حمى من أن يتلقى تطعيماً سابقاً.
- يتلقى من أن أو أكثر من الأشخاص الذين يتلقون الحمى التيفوئيد.
- ينصح من يتلقى الأشخاص بأن يتجنبوا الأطعمة والمشروبات الملوثة.

© منظمة الصحة العالمية 2011

الحقوق محفوظة، مكتب إقليم شرق المتوسط، منظمة الصحة العالمية، ص.ب ٧٠٨، المدينة الرياضية، مدينة نصر، القاهرة، جمهورية مصر العربية

طبع في مطبعة [insert printer details]